

Fondamenti di Omeopatia in Odontoiatria

A Cura del Dott. Salvatore Bardaro

PREPARAZIONE PSICHICA STATO D'ANSIA – AGITAZIONE

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Iponervoso - Ansia di anticipazione - Tremori generalizzati -
Sensazione di arresto cardiaco - Diarrea emotiva - Inibizione mentale e
motoria

IGNATIA AMARA

Ipernervoso - Pauroso – Angosciato – Non si abbandona non collabora –
Sospira – Nodo in gola – Sensazione Soffocamento - Tachipnea

ARGENTUM NITRICUM

Ansia di anticipazione – Apprensivo – Agitato – Impaziente - Precipitoso per
l'attesa – Tremoridegli arti – Pallore

MOSCHUS

Isterismo – Teatralità – Contraddittorio – Crisi lipotimicafalia

CHAMOMILLA

Iperestesico pediatrico – Irrequietezza – Agitazione – Intolleranze –
Capriccioso

PREPARAZIONE ALLE MANOVRE CHIRURGICHE ENDODONTICHE-ORTODONTICHE

ARNICA MONTANA

Prima scelta azione complessiva - Trauma – Ecchimosi – Dolore – Emorragia
per cause meccanico-chirurgiche

HYPERICUM PERFORATUM

Traumi delle terminazioni nervose – Dolore acuto – Lancinante irradiato
aggravato dal contatto e dalle scosse

LEDUM PALUSTRE

Traumi dei nervi e tessuti molli - Dolore sordo e localizzato

IPECA

Scialorrea – Nausea operativa intensa – Facilita le manovre

NUX VOMICA

Preventivo effetti tossici anestetici

XRAY

Preventivo indagini Rx

PREVENZIONE e TRATTAMENTO EMORRAGIE

CHINA REGIA

Emorragie post-estrattive o intra operatorie – Astenia – Vertigini – Pallore – Ronzii – Sangue rosso scuro

ARNICA MONTANA

Azione emostatica – Emorragie - Sangue rosso vivo – Fragilità dei capillari - Protettore endotelio

ACHILLEA MILLEFOLIUM

Emorragie con sangue fluido rosso brillante

CROTALUS HORRIDUS

Emorragia con sangue nero fluido – Non coagula

PULPITE ACUTA

ARSENICUM ALBUM

Dolore bruciante - peggioramento notturno – Migliora con bevande calde – Agitazione - Fase pre-ulcerosa, pre-necrotica

COFFEA CRUDA

Dolore lancinante intermittente, parossistico, nevralgico – Migliora con acqua fredda – Iperestesia rumori, tatto

HEPAR SULFUR

Dolore intollerante come una spina - Peggiora con sbalzi termici – Tendenza ascessuale della radice

ASCESSO DENTALE

STADIO PRE-ASCESSUALE:

PLANTAGO T.M.

Azione antisettica – Anti dolorifica

ECHINACEA T.M.

Azione immuno stimolante anti infiammatoria

FERRUM PHOSPHORICUM – APIS MELLIFICA – ARNICA MONTANA

Stato congestizio – Flogosi acuta - Differenziati per modalità termiche e dolorifiche

- **Ferrum Phosphoricum** Peggiora la notte, con caldo e con movimento. Migliora con riposo e con fresco
- **Apis Mellifica** Edema, infiammazione acuta e violenta, dolore bruciante e pungente. Irradia da destra a sinistra. Migliora con movimento e aria fredda. Peggiora con pressione, calore, contatto dei vestiti
- **Arnica Montana** Peggiora con contatto e immobilità. Migliora coricandosi

BRYONIA

Congestione del legamento – Sensazione dente più lungo – Dolore lancinante (tipica Periapicite Acuta) - Forte pressione riduce il dolore

AMMONIUM CARBONICUM

Dolore irradiato alla testa, occhi e orecchie – Ipersensibile al freddo

MEZEREUM

Dolore trafittivo irradiato ossa della faccia regione malare e tempie

STADIO SUPPURATIVO:

HEPAR SULFUR

Di prima scelta nell'ascesso franco caldo – Pus bianco giallastro – Dolore pungente

MERCURIUS SOLUBILIS

Tendenza a cronicizzare – Evoluzione linfatica – Adenopatia satellite dolente - Scialorrea abbondante – Alitosi – Lingua con impronte ai bordi

SILICEA

Tendenza a cronicizzare – Ascesso freddo – tendenza a fistolizzare

PYROGENIUM

Prevenzione stati settici e infettivi

DISODONTIASI DELL'OTTAVO – ALGIA - PERICORONARITE

CHEIRANTUS CHEIRI

Elettivo nella disodontiasi dell'ottavo

GENGIVO STOMATITE – AFTOSI

RIMEDI DI PRIMA INTENZIONE

PLANTAGO T.M.

Azione antiflogistica antiemorragica

CALENDULA T.M.

Azione antisettica antiflogistica

HYDRASTIS T.M.

Azione cicatrizzante delle ulcere

FLOGOSI ACUTA

BELLADONNA **Congestione**

APIS **Edema**

BRYONIA **Secchezza Mucose**

STADIO ULCEROSO

CANTHARIS

Gengive con ulcere e vescicole urenti - Sete intensa ma è impossibile bere perché si aggrava il bruciore

MERCURIUS SOLUBILIS H.

Lezione ulcerosa con sanguinamento, scialorrea, gusto metallico, alitosi. Gengive spongiose, congeste, dolore bruciante. Comparsa di scollamento e piccole tasche suppurate

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS

Stesse indicazioni di M. Solubilis H. ma in presenza di maggior aggressività

INDICAZIONI DI MASSIMA PER LE DILUIZIONI E LA POSOLOGIA: (In riferimento alle problematiche soprariportate)

Nell'ACUTO si usano le basse concentrazioni (4-5 CH), per brevi periodi (max 4-5 giorni), con alta frequenza di assunzione (anche ogni mezz'ora). Le assunzioni vanno distanziate man mano che la sintomatologia acuta si attenua.

Nel SUB ACUTO-CRONICO si usano concentrazioni più alte (15-30 CH), per periodi più lunghi e con frequenza di assunzione più bassa.